

JOHN CAPINPIN – BIỆT DƯỠNG GÀ TƠ 21 NGÀY

NGÀY – KHẨU PHẦN	THUỐC	CHẾ ĐỘ LUYỆN TẬP
1 AM 20g PM 35g	Thiabex/MEEB 0.5/0.5 Hỗn hợp Si-rô Protolyte Amino	Cột dây 6 m 6 am - 5 pm rồi sang tee-pee
2 AM 35g PM 40g	Calcium Lactate 12pm Centrum Performance 2pm	Cột dây/tee-pee
3 AM 35g PM 40g	Protolyte/Calcium L. 4pm	Lồng chạy với mái 9am - 4pm
4 AM 35g PM 40g	Viên ROBUST 2pm Calcium L.	Che tối 7am - 5pm Lồng bới trái có 20 phút 8:40pm Lồng nghỉ (limber) với đèn 20 phút 9pm
5 AM 35g PM 40g	Protolyte/Calcium L. Thịt bò xay (ground beef) 15g 9am	Cột dây 7am-12pm → tee-pee
6 AM 35g PM 40g	Centrum Performance 1/3 mỗi con	Xổ 5 chân CHỈ BỊT CỤA TRÁI
7 AM 35g PM 40g	Protolyte/Viên mầm lúa mì (wheat germ) Tắm 8am hong khô đến 1pm	Lồng chạy với mái 1pm -4:30pm
8 AM 35g PM 40g	Viên Voltiplex	Che tối 7am-5pm
9 AM 35g PM 40g	MEEB 0.3 7pm Thịt bò xay 10am 15g	Cột dây nơi râm mát
10 AM 35g PM 40g	KHÔNG DÙNG THUỐC	Lồng bới trái có 15 phút 7am Lồng nghỉ 30 phút 10pm
11 AM 35g PM 40g	Molasses pha nước Cả ngày	Che tối trong lồng dưỡng Cả ngày (trên chạc)
12 AM 35g PM 40g	Viên mầm lúa mì (wheat germ)	Xổ 3 chân Bịt cả 2 cửa, thả cách 1m
13 AM 35g PM 40g	Tắm dầu gội (shampoo) 8am rồi hong khô	Cột dây cả ngày trên nền đất (soil)
14 AM 30g PM	AM chỉ cho ăn, không uống thuốc Chế độ kiêng	Cột dây
15 AM 15g PM 35g	Ngâm bánh mì trong sữa 8am KHÔNG DÙNG THUỐC	Tẩy giun Hammer 4am Bắt đầu nạp carbohydrate Nhốt lồng dưỡng AM - 4PM Cho ăn bắp xay
16 AM 35g PM 40g	Dung dịch Trisulak Uống kháng sinh cả ngày	Tee-pee 7am - 12pm Che tối đến hôm sau
17 AM 35g PM 40g	Calcium lactate	Lồng chạy với mái 8am - 3pm Lồng nghỉ với đèn 15 phút 12am Xổ lần cuối 3 chân 12:15am
18 AM 35g PM 40g	Thịt bò xay 15g Tắm dầu gội 8am rồi hong khô Viên ROBUST/lồng dưỡng 1pm bắt đầu che tối	Lồng nghỉ với đèn 10 phút 2am Cho ăn 70% bắp xay (cracked corn)
19 AM 35g PM 40g	Kobalamin B-12 0.3cc Chích 7pm	Che tối lồng dưỡng (H2O 8 ngụm AM 8 ngụm PM) Phơi sương (pahamog) 11pm - 12am 80% bắp xay
20 AM 35g PM 30g	KHÔNG DÙNG THUỐC	Che tối lồng dưỡng (H2O 7 ngụm AM 5 ngụm PM) 95% bắp xay
21 NGÀY XUẤT TRƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP BIỆT DƯỠNG CỦA TÔI (CHO UỐNG VIÊN ROBUST 5 GIỜ TRƯỚC TRẬN ĐẤU)		

Lưu ý:

Không thay đổi thức ăn trong một tháng tiền biệt dưỡng (pre-con). Chiến kê phải trong tình trạng sức khỏe tốt, và tẩy giun 10 ngày trước khi biệt dưỡng (conditioning). Thịt bò xay phải tươi, chỉ cần trụng nước sôi trong 1 phút và trộn vào khẩu phần ăn.

Cho uống thuốc sau mỗi lần xổ và tập luyện. Bạn có thể điều chỉnh theo nhãn hiệu quen dùng. Đừng dùng Andriol cho gà tơ, MEEB vốn đã là hormon. Centrum Performance đủ dùng cho 3 gà tơ (chia ba).

Vào những ngày che tối (black out), để gà nghỉ dưỡng trong 10 phút vào 7am-10am-1pm-5pm. Nếu trời mưa, giảm bớt 3 ngụm nước mỗi lần uống, ví dụ: 8 – 3 = 5 ngụm.